

ECHELLE AMIEL-TISON

élaborée pour mesurer la douleur post-opératoire nourrisson de 1 à 7 mois

Utilisable de 0 à 3 ans

Score de 0 à 20, inversé par rapport à l'original

| JOUR | | | | | | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| HEURE | | | | | | | | | | | | |
| SOMMEIL PENDANT L'HEURE PRECEDENTE | | | | | | | | | | | | |
| 0 : sommeil calme de plus de 10 minutes | | | | | | | | | | | | |
| 1 : courtes périodes de 5 à 10 minutes | | | | | | | | | | | | |
| 2 : aucun | | | | | | | | | | | | |
| MIMIQUE DOULOUREUSE | | | | | | | | | | | | |
| 0 : visage calme et détendu | | | | | | | | | | | | |
| 1 : peu marquée, intermittente | | | | | | | | | | | | |
| 2 : marquée | | | | | | | | | | | | |
| QUALITE DES PLEURS | | | | | | | | | | | | |
| 0 : pas de pleurs | | | | | | | | | | | | |
| 1 : modulés, calmés par des incitations banales | | | | | | | | | | | | |
| 2 : répétitifs, aigus, douloureux | | | | | | | | | | | | |
| ACTIVITE MOTRICE SPONTANEE | | | | | | | | | | | | |
| 0 : activité motrice normale | | | | | | | | | | | | |
| 1 : agitation modérée | | | | | | | | | | | | |
| 2 : agitation incessante | | | | | | | | | | | | |
| EXCITABILITE ET REPOSE AUX STIMULATIONS AMBIANTES | | | | | | | | | | | | |
| 0 : calme | | | | | | | | | | | | |
| 1 : réactivité excessive à n'importe quelle stimulation | | | | | | | | | | | | |
| 2 : trémulations, clonies, Moro spontané | | | | | | | | | | | | |
| FLEXION DES DOIGTS ET DES ORTEILS | | | | | | | | | | | | |
| 0 : mains ouvertes, orteils non crispés | | | | | | | | | | | | |
| 1 : moyennement marquée, intermittente | | | | | | | | | | | | |
| 2 : très prononcée et permanente | | | | | | | | | | | | |
| SUCCION | | | | | | | | | | | | |
| 0 : forte, rythmée, pacifiante | | | | | | | | | | | | |
| 1 : discontinue (3 ou 4), interrompue par les pleurs | | | | | | | | | | | | |
| 2 : absente, ou quelques mouvements | | | | | | | | | | | | |
| EVALUATION GLOBALE DU TONUS MUSCULAIRE | | | | | | | | | | | | |
| 0 : normal pour l'âge | | | | | | | | | | | | |
| 1 : modérément hypertonique | | | | | | | | | | | | |
| 2 : très hypertonique | | | | | | | | | | | | |
| CONSOLABILITE | | | | | | | | | | | | |
| 0 : calmé en moins d'une minute | | | | | | | | | | | | |
| 1 : calmé après 1 à 2 minutes d'effort | | | | | | | | | | | | |
| 2 : aucune après 2 minutes d'effort | | | | | | | | | | | | |
| SOCIABILITE, contact visuel, réponse à la voix, intérêt pour un visage en face | | | | | | | | | | | | |
| 0 : facile, prolongée | | | | | | | | | | | | |
| 1 : difficile à obtenir | | | | | | | | | | | | |
| 2 : absente | | | | | | | | | | | | |
| SCORE TOTAL DE 0 (PAS DE DOULEUR) A 20 (DOULEUR MAJEURE) | | | | | | | | | | | | |

Barrier G, Attia J, Mayer MNB, Amiel-Tison C, Schnider SM. Measurement of post-operative pain and narcotic administration in infants using a new clinical scoring system.

Intensive Care Med 1989, 15 : 37-39